Lamivudina, zidovudina

Marca comercial: **Combivir**

Clase de medicamento: **Inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleósidos**

La lamivudina/zidovudina, conocida también como Combivir, es un compuesto de dos medicamentos contra el VIH, a saber, lamivudina (Epivir) y zidovudina (Retrovir). Ambos productos pertenecen a la clase de antirretrovirales llamados inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (NRTI). Estos medicamentos bloquean la transcriptasa inversa, una proteína que necesita el VIH para multiplicarse.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

La lamivudina/zidovudina fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) el 27 de septiembre de 1997 para empleo junto con otros antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el VIH en adultos y niños mayores de 12 años. No cura ni previene la infección por el VIH ni el SIDA ni reduce el riesgo de transmisión del virus a otras personas.

Presentación/Administración

El compuesto de lamivudina/zidovudina se fabrica en tabletas y puede tomarse con alimentos o solo. Este producto se fabricó porque sus dos componentes suelen recetarse juntos para tratar la infección por el VIH. Al mezclarlos es posible reducir el número de tabletas que se deben tomar a diario.

Dosis diaria recomendada

La dosis recomendada de lamivudina/zidovudina para adultos y adolescentes por lo menos de 12 años de edad es una tableta (150 mg de lamivudina y 300 mg de zidovudina) dos veces al día.

Algunos pacientes pueden necesitar una dosis diferente de lamivudina o zidovudina. Ellos no deben tomar Combivir (lamivudina/zidovudina).

Contraindicaciones

Las advertencias y los efectos secundarios del compuesto de lamivudina/zidovudina pueden ser similares a los de cada uno de esos productos por separado. (Para más información véanse los resúmenes particulares de la lamivudina y la zidovudina.) Los niños menores de 12 años no deben tomar lamivudina/zidovudina. Las personas con enfermedad de la sangre, enfermedad de los riñones o del hígado o inflamación del páncreas deben informar de ello al médico antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, este compuesto puede causar algunos efectos adversos. Los efectos secundarios graves de este medicamento incluyen: ardor, hormigueo o dolor de las manos, los brazos, los pies o las piernas; escalofrío; problemas del oído, de la nariz o de la garganta; fiebre; dolores musculares; náusea; palidez de la piel; intenso dolor de estómago; erupción de la piel; cansancio o debilidad poco comunes; vómito o amarillamiento de los ojos o la piel. Es preciso informar al médico si ocurre cualquiera de estos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo del medicamento. Entre los efectos secundarios leves de este medicamento cabe citar tos, diarrea, mareo, dolor de cabeza, inapetencia, cólico o dolor de estómago leve; y dificultad para dormir. Es preciso informar al médico si estos efectos secundarios continúan o molestan.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian lamivudina, zidovudina, visite el sitio web de AIDSinfo: http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba lamivudina, zidovudina. Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de clinicaltrials.gov en http://www.clinicaltrials.gov para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Lamivudine/Zidovudine AND HIV infections.

Lamivudina, zidovudina

AIDSinfo
Un servicio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

Fabricantes

Lamivudine/Zidovudine
GlaxoSmithKline
5 Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709
(888) 825-5249

Combivir
GlaxoSmithKline
5 Moore Drive
Research Triangle Park, NC 27709
(888) 825-5249

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

• al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este

• al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este